

NEVER EVENTS 1 : Erreur lors de la prise en charge des patients traités avec des médicaments anticoagulants oraux : AVK



HEMORRAGIE/ THROMBOSE

PRESCRIPTION

- En cas de prescription d'AVK, renforcer la surveillance des patients âgés de + de 75 ans, et /ou ayant un poids < 50 kg.
- **Surveillance de l'INR**: toutes les 48 h jusqu'à équilibration, toutes les semaines, le 1^{er} mois, tous les mois lorsque le traitement est équilibré.

STOCKAGE

- les AVK sont sensibles à la lumière et à l'humidité, il est important de les conserver dans leur emballage d'origine, de les stocker à température ambiante et à l'abri de la chaleur et au sec.

DISPENSATION

- **Vérification des posologies**
- La posologie des AVK est variable et adaptée selon les résultats biologiques.
- Pas de substitution sans accord du prescripteur

ADMINISTRATION

- Risque de confusion avec d'autres **médicaments quadrisécables**
- Conserver le médicament dans son blister jusqu'à l'administration

SUIVI

- Régularité des prises par le patient
- Surveillance des saignements
- Eviter les aliments riches en vitamine K (laitue, épinard, brocolis...)
- **Suivi par le patient de l'INR**



MOYENS DE PREVENTION HAD : identifié avec **sticker médicament à risque** et stocké dans la boîte noire médicament à risque fermée avec cadenas.