

**RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DU TRAITEMENT ANTICANCEREUX ORAUX**

	Il est préférable que les médicaments soient délivrés dans la même pharmacie : meilleure gestion et meilleur suivi des traitements du patient.
	<p>Ne pas écraser ni couper les comprimés, ni ouvrir les gélules Le patient ne doit pas croquer ou mâcher le médicament Faire prendre les traitements les uns après les autres, en position assise pour limiter le risque de fausse route. Vérifier régulièrement les conditions de prise (à jeun ou au moment des repas ; une ou plusieurs fois par jour, par semaine...).</p> <p>Il est recommandé de manipuler les comprimés/gélules avec des gants, ou de se laver les mains avant et après manipulation.</p>
At home domicile	Traçabilité des prises : dans le logiciel AT Home et sur les supports spécifiques de prises s'ils existent (carnet de suivi, calendrier ou autre).
	Certaines tisanes ou d'autres produits (certaines phyto/aromathérapies, compléments alimentaires...) sont à éviter (millepertuis et nouvelles plantes) ainsi que le pamplemousse (jus de fruits) : interactions avec le médicament.
	Le patient ne doit pas prendre d'anti acides ou d'anti sécrétoires sans avis médical : diminution de l'absorption de certains anticancéreux oraux.
	Importance de la nutrition : conseiller des repas fractionnés si le patient manque d'appétit : surveiller les apports protéiniques, le poids et le risque d'hypoalbuminémie.
	Le traitement anticancéreux peut modifier la fonction rénale : contacter le médecin prescripteur. Surveillance de l'hydratation : il est important de dire au patient de boire davantage pendant le traitement pour le bon fonctionnement des reins, sauf contre-indication médicale.
	Surveillance du poids : <ul style="list-style-type: none"> - Perte de poids : manque d'apports nutritionnels. Consultation diététique à recommander, ou avis médical. - Prise de poids rapide : vérifier si œdèmes si membres inférieurs, dyspnée ; A signaler au médecin prescripteur.
	Le traitement anticancéreux peut entraîner des risques de chute et des troubles cognitifs : il est conseillé au patient des temps de repos entre les temps d'activité.

Liste des questions à se poser :

	<p>Le patient présente t'il :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des troubles digestifs : nausée, vomissement, diarrhée, constipation, anorexie, douleur abdominale ... ? - Des problèmes cutanés /neurologiques : éruption, rougeur, sécheresse, sensibilité et/ou douleur des extrémités, fourmillements, syndrome mains - pieds ... ? - Un diabète ? si oui risque aggravation des neuropathies .. ? - Des douleurs au niveau de la bouche (mucite, stomatite) ? - Une dyspnée ? une toux ? - De la fièvre ? des saignements ? une fatigue inhabituelle ? - Une tension artérielle normale ? des douleurs thoraciques ? - Un poids stable ? - Un état dépressif /déprimé ?
--	---



Pour retrouver les documents spécifiques des différents anticancéreux oraux : utilisez FICHES VOC

Application Fiches VOC

Téléchargez et retrouvez nos
fiches d'information sur les **médicaments** par
«Voie Orale contre le Cancer»

DISPONIBLE SUR
Google Play

Télécharger dans
l'App Store

INSTALLER

**RAPIDE
FIABLE
GRATUIT**

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Libéraux et hospitaliers
Points de surveillance, entretiens pharmaceutiques

PATIENTS
Gestion du médicament
Prévention des principaux effets indésirables